# Troubles de la déglutition



Prévention des fausses routes

dans les atteintes neurologiques chez l'adulte



# Sommaire


Definition
Quand on avale
Les intervenants5
Le rôle de chacun5
Prévenir les troubles 6
En cas de fausses routes7
Déroulement du repas8
Alimentation
Conseils pratiques12

Ce livret est destiné au patient, à son entourage, au personnel soignant et aux aidants.

## Définition

## La déglutition est l'acte d'avaler :

c'est faire passer le bol alimentaire de la bouche dans le pharynx, puis de l'œsophage dans l'estomac.



Dans la bouche, on mâche les aliments, la langue les entraîne vers l'arrière :

**PHASE VOLONTAIRE** 

Dans le pharynx, le réflexe de déglutition se déclenche, la trachée se ferme pour éviter les fausses routes :


**PHASE REFLEXE** 

Dans l'œsophage, le bol alimentaire descend dans l'estomac:

PHASE REFLEXE


# **Quand on avale**





**Baisser la tête** 

Ne pas faire



Lever la tête



# Le rôle de chacun

- Médecin : pose et annonce le diagnostic.
- Infirmier : éduque le patient, supervise le repas, pratique l'aspiration et la manœuvre de Heimlich si besoin.
- Aide soignant : installe le patient, vérifie le plateau, aide et surveille le repas.
- ASH : connaît les patients ayant des troubles de déglutition, accompagne l'aide soignant pour la distribution des repas, alerte en cas de risque.
- Diététicienne : compose les menus selon les besoins du patient (régimes associés, textures, goûts, habitudes).
- Orthophoniste : fait le bilan, pratique la rééducation de la déglutition, informe le patient, la famille et l'équipe.
- Kinésithérapeute : pratique une rééducation pour assurer le maintien du tronc et de la tête et travaille la respiration.
- Ergothérapeute : adapte l'installation du patient au fauteuil et conseille le matériel nécessaire.
- Psychologue : aide et soutient le patient et son entourage dans ses difficultés.
- Assistante sociale : assure le lien avec les intervenants au domicile, met en place des aides humaines et financières.
- Famille : doit s'informer pour comprendre le trouble, aide le patient à respecter les consignes de sécurité.

# Prévenir les troubles

## Au cours des repas :

certains signes peuvent annoncer un trouble de déglutition.

## En dehors des repas :

d'autres signes sont à surveiller et certaines fonctions à vérifier.

### SIGNES D'ALERTE

- Peur de passer à table
- Trop grosses bouchées
- Stockage des aliments dans les joues Durée du repas : trop court
- Douleur à la déglutition

- Toux
- Bave
- Durée du repas : trop court ou trop long

### **SURVEILLER**

- La déshydratation
- · La perte de poids
- Les encombrements bronchiques

### **VERIFIER**

- L'état buccal : dents, appareil dentaire, langue, gencives
- La motricité bucco-faciale : lèvres, joues, langue
- La sensibilité bucco-faciale : au chaud, au froid, à la consistance
- L'état cognitif : compréhension, mémoire, attention et concentration
- Le comportement : agitation, dépression,
  - conscience des troubles

## En cas de fausses routes

## SIGNES D'ETOUFFEMENT

- Grimaces
- Changement de la coloration de la peau
- Suffocation
- Transpiration

### **FAIRE**

- Garder son calme
- Faire tousser et cracher
- Pratiquer la manœuvre de Heimlich
- Appeler le SAMU

Si besoin, l'infirmière pratique une aspiration trachéale

## **NE PAS FAIRE**

- Mettre la tête en arrière
- Taper dans le dos

### Manœuvre de Heimlich



Exercer une forte pression de bas en haut pour expulser le corps étranger

### Dé epas

## Quand on fait manger la personne hospitalisée

ou quand elle mange seule en chambre ou en salle à manger

### **Avant**

#### Installation

la personne est bien assise, la table bien positionnée

#### Environnement

l'ambiance est calme, sans radio et sans télévision

#### Présentation

le plat est appétissant et le plateau bien présenté

## • S'assurer des goûts

vérifier que les goûts de la personne soient respectés



### **Pendant**


- S'asseoir face à la personne
- Donner de petites bouchées
- Présenter la cuillère par le bas
- Privilégier le chaud et le froid, pas le tiède



# Dérouleme

### **Pendant**

- Faire baisser la tête
- Inciter à mâcher et à avaler
- S'assurer que la bouche est vidée
- Faire des pauses à chaque bouchée
- Faire tousser de temps en temps
- Ne pas faire parler en mangeant



## **Après**

- Retirer le plateau dès la fin du repas
- Ne laisser ni aliments, ni boissons dans la chambre
- Laisser la personne assise 20 minutes après le repas

## **Alimentation**

## **Progression**

Pour éviter les fausses routes, on respectera la progression suivante:

> Les aliments mixés, allongés avec une sauce ou un bouillon sont autorisés.

### **BOISSONS**

- Boissons gélifiées
- Boissons épaissies
- **Boissons pétillantes**
- **Boissons normales**

### **ALIMENTS**

- Alimentation par sonde
- Alimentation complètement mixée
- Alimentation hachée finement Éviter les textures sèches et collantes
- Alimentation hachée avec ajout de petits morceaux tendres Éviter filandreux, granuleux, friables
- Alimentation avec aliments tendres Éviter filandreux, granuleux, friables
- Alimentation normale Tout est autorisé

## **Alimentation**

### **Aliments**

Exemples d'aliments à privilégier ou à éviter (liste non exhaustive)

### **A CONSEILLER**

### Fluides

flan compote crème purée...

### • Epais

légumes écrasés omelette fromage fondu fromage blanc camembert pain trempé...

#### Haché

viande poisson...

### **A EVITER**

### • Liquide

eau, lait café, thé jus de fruits...

### Granuleux

riz, biscotte semoule, couscous maïs, coquillettes...

### Filandreux

blanc de poulet, jambon cru endives, poireaux haricots verts. ananas, rhubarbe...

### Solides

pain, viande grillée crudités, spaghetti...

# **Conseils pratiques**

## Pour plus d'informations

- Association des diététiciens de langue française
  35 allée Vivaldi 75012 Paris
  Tél.: 01 40 02 03 02 www.adlf.org
- Fédération Nationale des orthophonistes 145 bd Magenta - 75010 Paris Tél.: 01 40 35 63 75 - www.orthophonistes.fr
- Il existe différentes associations de patients et de familles en rapport avec les différentes pathologies.

## Aide à la préparation des repas

- Il existe des livres de recettes mixées.
  Vous pouvez contacter l'orthophoniste ou la diététicienne pour obtenir des références.
- Laboratoires fournisseurs d'eau gélifiée et d'épaississant (voir en pharmacie)

## Numéros utiles

- **SAMU** 15
- Pompiers 18
- Urgence portable 112